

四庫全書

子部

欽定四庫全書

仁齋直指卷十七

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

消渴

消渴方論

水包天地前輩嘗有是說矣然則中天地而為人水亦可以色潤五臟乎曰天一生水腎實主之膀胱為津液之府所以宣行腎水上潤於肺故識者以肺為津液之

臟自上而下三焦臟腑皆圓乎天一真水之中素問以  
水之本在腎末在肺者此也真水不竭安有所謂渴哉  
人惟淫慾恣情酒麪無節酷嗜炙煇糟藏鹹酸酢醢甘  
肥腥羶之屬復以丹砂五石濟其私於是炎火上熏臟  
腑生熱燥氣熾盛津液乾焦渴引水漿而不能自禁矣  
渴之為病有三曰消渴曰消中曰消腎分上中下三焦  
而應焉熱氣上騰心虛受之心火散漫不能收斂胃中  
煩燥舌赤唇紅此渴引飲常多小便數而少病屬上焦

謂之消渴熱蓄於中脾虛受之伏陽蒸胃消穀善飢飲  
食倍常不生肌肉此渴亦不甚煩但欲飲冷小便數而  
泔病屬中焦謂之消中熱伏於下腎虛受之腿膝枯細  
骨節酸疼精走髓虛引水自救此渴水飲不多隨即溺  
下小便多而濁病屬下焦謂之消腎自消腎而析之又  
有五石過度之人真氣既盡石氣獨留而腎為之石陽  
道興強不交精泄謂之強中消渴輕也消中甚焉消腎  
又甚焉若強中則其斃可立待也雖然真水不充日從



事於盃勺之水其間小便或油膩或赤黃或泔白或渴而且利或渴而不利或不渴而利但所食之物皆從小便出焉甚而水氣浸漬溢於肌膚則脹為腫滿猛火自炎留於肌肉則發為癰疽此又病之深而證之變者也總前數者其何以為執劑乎吁此虛陽炎上之熱也叔和有言虛熱不可大攻熱去則寒起請援此以為治法又曰消渴證候人皆知其心火上炎腎水下泄小便愈多津液愈涸飲食滋味皆從小便消焉是水火不交濟

然爾孰知脾土不能制腎水而心腎二者皆取氣於胃  
乎治法總要當服真料參苓白朮散可以養脾自生津  
液兼用好粳米煮粥以膾肉碎細入鹽醋油酒葱椒茴  
香調和少頃粥熟而後入以此養腎則水有所司又用  
淨黃連溫剉入雄猪肚中密扎於斗米上蒸爛添些蒸  
飯白中杵粘圓如桐子每服百粒食後米飲下可以清  
心止渴

消渴證治

茯苓丹三疳渴通用亦治白濁

兔絲子

酒浸叁宿水淘砂盆研細捏餅焙乾壹拾兩

北五味子

柒兩

白伏苓

伍兩

石蓮肉

叁兩

右末山藥陸兩末為糊攪和搗叁百杵圓桐子大每

伍拾圓食前米湯下神妙

降心湯治心火上炎腎水不濟煩渴引飲氣血日消

人參

遠志

薑淹取肉焙

當歸

川芎

熟地黃

白伏苓

黃耆

蜜炙

北五味子

甘草

微炙各半兩

天花粉

壹兩

右剉細每參錢棗煎食前服

生地黄膏渴證通用

生地黄

東如常梔大貳把

冬蜜

壹梔

人參

半兩

白茯苓

壹兩

右將地黄洗切研細以新水壹梔調開同蜜煎至半次入參苓末拌和磁器密收匙挑服

黃耆湯治諸渴疾

黃耆

伏神

瓜蒌根

麥門冬

去心各壹兩

北五味子

甘草

炙各半兩

生乾地黄

壹兩半

右剉細每肆錢新水煎服

猪肚圓治諸渴疾

川黃連

伍兩

淨白乾葛

知母

伏神

麥門冬

去心

大熟地黄

洗焙各貳兩

瓜蒌根

粟米

各叁兩

人參

壹兩

右木臼中同搗為散入淨猪肚內縫密置甑內蒸極爛乘熱再杵細若硬加少蜜丸桐子大蒸汁下伍拾丸或粥飲下

又方一味黃連末入猪肚內縫密滿甑粳米上蒸熟日過杵丸如前法

川黃連丸治諸渴

川黃連

淨伍兩

白天花粉

麥門冬

去心各貳錢半

右末以生地黃汁并牛乳汁夾和搗圓桐子大每參  
拾丸粳米飲下

玉泉圓治煩渴口乾

麥門冬

去心晒

人參

茯苓

黃耆

半生半蜜炙

烏梅肉

焙

甘草

各壹兩

瓜蒌根

乾葛

各壹兩半

右末煉蜜丸彈子大每壹丸溫湯嚼下

止渴劉散

枇杷葉

新布拭去毛炙

白乾葛

生薑

切片焙各壹兩

大烏梅

染箇

大草果

貳箇去皮

淡竹葉

甘草

生各半兩

右剉每肆錢新水煎服

衛生天花圓治渴通用

黃連

淨叁兩童尿浸叁宿焙

白扁豆

薑製去皮炒貳兩

辰砂

白伏苓

牡蠣粉

知母

苦參

天花粉



鐵粉

各半兩

蘆會

壹分

金銀箔

各貳拾片

右末取瓜萋根生汁和生蜜圓桐子大每參拾丸麥

門冬湯下

桑椹方治渴疾桑椹熟時盡意食之為妙

又方生牛乳細呷○又方生蘿蔔搗取汁時飲少許

蠟苓圓補虛治濁止渴

黃蠟

雪白伏苓

各肆兩

右伏苓為末鎔蠟和圓彈子大每壹丸不飢飽細嚼

下

繭絲湯治渴神效煮繭搔絲湯任意飲之頓效如非時以絲或綿煎湯服

辰砂妙香散治渴證小便澁數而瀝兼有油濁

方見痘門

用

燈草伏苓煎湯下

天花粉圓治消渴飲水多身體瘦

天花粉

黃連

去鬚各壹兩

伏苓

當歸

各半兩

右末煉蜜圓桐子大每參拾丸茅根煎湯下

瓜蓮丸治消渴骨蒸

黃連

淨剉用冬瓜汁浸  
壹宿曬乾凡柒次

右末冬瓜汁丸桐子大每三四十丸半飢飽熟水下或  
伍拾丸米飲下

玉壺丸治消渴引飲無度

人參

瓜萋根

等分

右末煉蜜丸桐子大每參拾丸麥門冬煎湯下

天花散治消渴

天花粉

生乾地黄

洗各壹兩

乾葛

麥門冬

去心

北五味子

各半兩

甘草

壹分

右麤末每服參錢粳米伯粒同煎服

錢氏白朮散治消中消穀善飢

人參

白朮

白茯苓

甘草

炙

霍香葉

壹兩

白乾葛

貳兩

木香

半兩

加北五味子

柴胡

枳殼

製各  
半兩

右麤末每參錢新水煎服

伏神丸治消中煩渴消穀小便數

人參

伏神

生乾地黄

黃連

淨

麥門冬

去心  
焙

枳殼

製

牡蠣粉

各壹  
兩

石蓮肉

黃耆

炙

知母

各半  
兩

瓜蒌根

叁  
分

右末煉蜜同搗參百杵丸桐子大每伍拾丸清粥飲

下

小兒絲子丸治消腎以天花粉北五味子煎湯下  
方見  
痘門

枸杞子丸治消腎久渴困乏小便滑數

枸杞

兔絲子

酒浸  
研焙

白茯苓

黃耆

炙

牡蠣粉

牛膝

熟地黃

洗

麥門冬

去心各  
壹兩

雞內金

微炙壹  
兩半

桑螵蛸

瓜蒌根

各叁  
分

山茱萸

牡丹皮

各半  
兩

右末煉蜜和搗參百杵丸桐子大每伍拾丸食前粥飲下

八味圓治消腎補虛止渴

方見癰冷門

本方去附子以北五

味子代之內澤瀉截塊再蒸熟地黃再蒸

平補圓治消腎不渴肌肉瘦削小便澁數而瀝如欲滲之狀

兔絲子

酒浸研焙

山茱萸

酒浸焙

當歸

益智仁

各半兩

川練肉

牛膝

葫蘆巴

炒

厚杜仲

薑製炒

巴戟

去心

茯苓

酒浸焙各叁錢半

乳香

貳錢

右末糯米糊丸桐子大每伍拾丸棗湯或鹽湯食前

服

雙補丸治腎虛水涸燥渴勞倦

鹿角膠

貳兩

沉香

半兩

澤瀉

截塊再蒸半兩

覆盆子

白茯苓

人參

宣木瓜

薏苡仁

黃耆

炙



熟地黄

洗再蒸

茯苓

酒浸焙

兔絲子

酒浸蒸碾焙

北五味子

石斛

炒

當歸

酒浸焙各壹兩

麝香

壹錢

右末煉蜜丸桐子大朱砂衣每伍拾丸空心棗湯下

熬蟲方治消渴有蟲

出夷堅志

苦練根取新白皮壹握切焙

入麝少許水貳碗煎至壹碗空心飲之雖困頓不妨自浸下蟲三四條狀如蛔蟲其色真紅而渴頓止乃知消渴一證有蟲耗其津液

附諸方

麥門冬飲子治膈消胃脹滿心煩津液乾燥短氣消渴

人參

伏神

麥門冬

知母

五味子

生地黃

甘草

炒

括萎根

葛根

各等分

每服水貳鍾竹葉拾肆片煎去滓溫服

生津甘露飲子

東垣方

治膈消大渴飲水無度舌上赤澁

上下齒皆麻舌根強硬腫痛食不下腹時脹痛渾身色

黃白白睛黃甚則四肢痿弱無力面塵脫色脇下急痛  
善噎善怒健忘癆腰背寒兩丸冷甚

石膏

壹錢  
貳分

人參

炙甘草

各貳錢

生甘草

山梔子

葶澄茄

白豆蔻

香白芷

連翹

各壹錢

杏仁

去皮  
尖

黃蘗

酒拌各  
壹錢半

白葵

麥門冬

各半  
錢

黃連

木香

各叁  
分

桔梗

叁  
錢

升麻

知母

酒製各  
貳錢

薑黃

錢壹

當歸身

錢半

全蝎

錢貳

藿香

分貳

柴胡

分叁

蘭香

錢半

右件為細末如法湯浸蒸餅和勻成劑捻作餅子晒半乾杵碎篩如黃米大食後每服貳錢抄於掌中以舌舐之隨津嚥下或送以白湯少許亦可此制之緩也不惟不成中滿亦不傳下消矣戊申正月七日葉律千戶服此大効

枇杷葉散治消渴胃滿心煩津液大消

枇杷葉

去毛水沈貳張

麥門冬

去心壹錢

五味子

去梗伍分

瓜蒌實

生地黃

人參

去苗蘆各柒分

茯苓

去木

粉葛

家種者佳壹錢

知母

去毛

甘草

炙已上各柒分

右作壹服水貳鍾竹葉拾肆片入烏梅壹箇去內仁

煎柒分去滓食遠溫服不拘時

人參石膏湯

即白虎加人參湯

治膈消上焦燥渴不欲飲食

人參

半兩

石膏

壹兩貳錢

甘草

肆錢

知母

染錢

東垣加黃芩杏仁

右吹咀每服壹兩水貳盞粳米壹撮煎至壹盞去滓

通口服

硃砂黃連丸

秘方

治心虛蘊熱或因飲酒過多發為消渴

硃砂

貳兩  
別研

黃連

叁兩

生地黃

貳兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服伍拾丸燈心棗子湯

送下

人參白朮湯

宣明方

治胃膈痺熱煩滿飢不欲食痺成為

消中善食而瘦燥熱鬱甚而成消渴多飲而數小便兼  
療一切陽實陰虛風熱燥鬱頭目昏眩中風偏枯酒過  
積毒一切腸胃燥澁倦悶壅塞瘡疥痿痺并傷寒雜病  
產後煩渴氣液不得宣通

人參

白朮

當歸

芍藥

大黃

山梔子

荊芥穗

薄荷

桔梗

知母

澤瀉

各半兩

茯苓

去皮

連翹

瓜蒌根

乾葛

各壹兩

甘草

叁兩

藿香葉

青木香

官桂

各壹分即貳錢半是也

石膏

肆兩

寒水石

貳兩

滑石

半斤

右為細末每服抄伍錢水壹茶盞入盆消半兩生薑  
叁片煎至半盞絞汁入蜜少許溫服漸加至拾餘錢  
得臟腑流利取効如常服以意加減兼服消痞丸散  
以散腸胃結治濕熱內甚自利者去了大黃芒硝



調胃承氣湯治消中暑熱在胃而能飲食小便黃赤

方見

傷寒門

三黃丸

方見火門

加減八味丸治腎水枯竭心火炙炎煩燥渴小便頻數

白濁陰痿飲食不多肌膚日削本方減附子加五味子

六味地黄丸

方並見虛勞門

針灸法脾俞二穴

在十一椎下各間寸半

中脘一穴

在臍上四寸

治飲

不止渴三里二穴

在膝下三寸大脛骨外廉兩筋間舉足取之

治食不充飢

太谿二穴

在足內踝後跟骨上動脈陷中

治房勞腎消

脹滿

脹滿方論

陰陽愆伏榮衛凝滯三焦不能宣行脾胃不能傳布此  
脹滿之所由生也曰穀脹曰水脹曰氣脹曰血脹或冷  
或熱又不可以無別失飢傷飽痞悶停酸旦則陰消陽  
長穀氣易行故能飲食暮則陰長陽消穀氣難化故不  
能食是為穀脹脾土受濕不能制水水漬於腸胃而溢

於體膚漉漉有聲怔忡喘息是為水脹七情鬱結氣道  
擁隔上不得降下不得升身腫大而四肢瘦削是為氣  
脹煩燥漱水迷忘驚狂痛悶嘔惡虛汗厥逆小便多大  
便黑婦人尤多見之是為血脹陽熱為邪則身體有熱  
脹滿而咽乾陰寒為邪則吐不下食脹滿而自利隨證  
劑量是固然爾抑猶有虛實之辨焉實者腹中常脹外  
堅內痛按之不陷法當為之疏利虛者時脹時減虛氣  
留滯按之則濡法當以溫藥和之此又出於隨證劑量

之外其若久病羸乏卒然脹滿喘息不得與夫臍心突起或下利頻頻百藥遍嘗未見一愈者耳

脹滿證治

十膈散治七氣為隔飲食不消穀脹氣脹通用

人參

伏苓

厚朴

製

橘紅

蓬朮

枳殼

製

半夏麴

甘草

炙

生白朮

辣桂

檳榔

木香

等分

右麤末每參錢薑貳片棗貳枚煎服

大異香散治穀脹氣脹

京三稜

蓬朮

青皮

陳皮

半夏麴

藿香

北梗

益智仁

枳殼製

香附

炒各  
半兩

甘草

炙叁  
分

右剉散每參錢薑伍片棗貳枚煎服

五膈寬中散治七氣留滯飲食不下氣滿膨脹

方見諸  
氣門

葶澄茄圓治痞滿脹痛穀脹氣脹通用

葶澄茄

白豆蔻仁

縮砂仁

青皮

蘿菔子

木香

各叁分

肉豆蔻

茴香

炒

辣桂

丁香

各壹分半

陳皮

叁分

右末飛麪煮稀糊圓桐子大每叁拾圓陳皮煎湯下

調氣散治氣滯脹滿宿食不消

方見諸氣門

大半夏湯

方見痰涎門

小半夏伏苓湯

方見水飲門

二藥加橘紅

北梗檳榔甘草

炙

並主水氣脹滿

和劑流氣飲調榮衛利三焦行痞滯消腫

方見諸氣門加減見水飲門

調降湯治氣脹

方見喘門

沉香降氣湯治陰陽交滯心腹脹滿留飲停酸積冷諸

證

方見諸氣門

人參芎歸湯治血脹

當歸

半夏

製叁分

川芎

壹兩

蓬朮

木香

縮砂仁

烏藥

甘草

炙各半兩

人參

辣桂

五靈脂

炒各壹分

右剉散每服參錢薑伍片棗貳枚紫蘇肆葉煎食前服

溫胃湯治冷則氣聚脹滿不下食

熟附子

當歸

厚朴

製

人參

橘紅

半夏麴

生白薑

甘草

炙各壹兩

川椒

去合口者叁分



右劉散每服參錢棗貳枚食前煎服

順氣木香散治冷證腫脹泄瀉

方見諸氣門

枳殼劉散治熱證脹滿

厚朴

製

枳殼

製

北梗

各半兩

甘草

炙

大黃

蒸各壹分

右劉每參錢薑伍片棗貳枚烏梅壹枚煎服

感應圓

丁香

木香

各壹兩半

乾薑

壹兩煨

深村百草霜

貳兩 淨

大杏仁

壹百肆拾箇 去皮尖

肉豆蔻

貳拾箇

肥巴豆

柒拾粒 畧去油

黃蠟

肆兩用 老酒煮

麻油

壹兩 秋冬添半兩 減蠟半兩

右將丁香木香薑蔻為細末并三味研極得所煉油

蠟和劑油單裹漸圓菴豆大每伍柒圓加至拾伍圓

熟水下夾蘇合香圓

方見諸氣門

通利脹滿雖然感應圓

只可治痢不可治瀉蓋痢家服之有積則行無積則止若以此亦可治瀉誤人已上數劑前氣類多用之

方却在此

附諸賢論

東垣曰六元政紀論云太陰所至為中滿

云云

太陰所

至為畜滿

云云

諸濕腫滿皆屬脾土論云脾乃陰中之

太陰同濕土之化脾濕有餘腹滿食不化天為陽為熱  
主運化也地為陰為濕主長養也無陽則陰不能生化  
故云藏寒生滿病調經篇云因飲食勞倦損傷脾胃始受  
熱中末傳寒中皆由脾胃之氣虛弱不能運化精微而

制水穀聚而不散而成脹滿經云腹滿填脹支膈脇脇  
下厥上冒過在太陰陽明乃寒濕鬱遏也脉經所謂胃  
中寒則脹滿者是也

鍼經三卷  
雜病第八

腹滿大便不利上走胃

溢喘息喝喝然取足少陰又云脹取三陽三陽者足太  
陽寒水為脹與通評虛實論說腹暴滿按之不下取太  
陽經絡胃之募也正回取者瀉也經云中滿者瀉之於  
內者是也宜以辛熱散之以苦瀉之淡滲利之使上下  
分消其濕正如開鬼門潔淨府溫衣繆處其處是先瀉

其血絡後調其真經氣血平陽布神清此治之正也或  
曰諸脹腹大皆屬於熱者何也此乃病機摠辭假令外  
傷風寒有餘之邪自表傳裏寒變為熱而作胃實腹滿  
仲景以大承氣湯治之亦有膏粱之人濕熱鬱於內而  
成脹滿者此熱脹之謂也大抵寒脹多而熱脹少治之  
者宜詳辨之心法附錄曰心肺陽也居上腎肝陰也居  
下脾居中亦陰也屬土經曰飲食入胃遊溢精氣上輸  
於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四

布五經並行是脾具坤靜之德而有乾健之運故能使  
心肺之陽降腎肝之陰升而成天地交之泰是為無病  
今也七情內傷六淫外侵飲食不節房勞致虛脾土之  
陰受傷轉運之官失職胃雖受穀不能運化故陽自升  
陰自降而成天地不交之否清濁相混隧道壅塞鬱而  
為熱熱留為濕濕熱相生遂成脹滿經曰鼓脹是也以  
其外雖堅滿中空無物有似於鼓其病膠固難以療治  
又名曰蠱若虫侵蝕之義理宜補脾又須養肺金以制

木使脾無邪賊之患滋腎水以制火使肺得清化却厚  
味斷妄想遠音樂無有不安醫又不察虛實急於作効  
病者苦於脹急喜行利藥以求通快不知寬得一日半  
日其腫愈甚病邪甚矣真氣傷矣古方惟禹餘糧丸又  
名紫金丸制肝補脾殊為切當又曰朝寬暮急血虛暮  
寬朝急氣虛終日急氣血皆虛嚴氏曰脹脉浮者易治  
虛者為難治

平肝飲子

濟生方

專治喜怒不節肝氣不平邪乘脾胃心

腹脹滿頭暈嘔逆脉來浮弦

防風

去蘆

桂心

不見火

枳殼

赤芍藥

桔梗

去蘆炒各壹兩

甘草

炙

木香

不見火

人參

檳榔

當歸

去蘆酒浸

川芎

陳皮

半兩

右咬咀每服肆錢水壹盞薑伍片煎服不拘時  
木香順氣湯治濁氣在上則生膈脹

木香

壹錢貳分

厚朴

製壹錢陸分

青皮



陳皮

益智

白茯苓  
去皮

澤瀉

乾薑

半夏  
洗

吳茱萸

各壹錢  
捌分

當歸

升麻

柴胡

各肆  
分

蒼朮

米泔浸  
貳錢

草豆蔻

煨壹錢  
貳分

右㕮咀分二貼每貼水貳盞薑參片煎捌分食前溫服忌生冷硬物恚怒

廣茂潰堅湯治中滿腹脹內有積聚堅硬如石令人坐卧不能二便澁滯上喘氣促面色痿黃通身虛腫

厚朴

製

黃芩

草豆蔻

麩畏  
煨

益智仁

炒

當歸

酒洗各  
貳錢半

黃連

分叁

半夏

湯泡叁  
分半

蓬朮

煨

紅花

吳茱萸

湯泡去  
苦水

升麻

甘草

炙

柴胡

澤瀉

神麩

炒

陳皮

青皮

各壹  
錢半

右吹咀分二貼每貼水貳鍾薑參片煎捌分食遠服

木香塌氣丸治中滿腹脹

陳皮

蘿蔔子

炒各伍錢

胡椒

木香

草豆蔻

煨麩錢

青皮

各叁錢

蝎梢

炒去毒貳錢半

右為細末麩糊為丸如梧桐子大每服伍拾丸食遠

米飲下

禹餘糧丸治中滿氣脹喘滿及水氣脹

蛇含石

叁兩煨

真針砂

伍兩

禹餘糧

叁兩同上砂炒

右已上三味為主其次量人虛實入下項藥

木香

牛膝

蓬朮

炮

白茯苓

桂心

川芎

白豆蔻

茴香

炒

三稜

炮

菴活

伏苓

乾薑

青皮

陳皮

附子

炮

當歸

各半兩

右為細末拌勻以湯浸蒸餅去水搗勻丸如桐子大  
每服伍拾丸空心溫酒送下

中滿分消丸治中滿鼓氣水氣等証

卷十七

黃芩

錢炒伍

薑黃

白朮

人參

甘草

炙

豬苓

錢各壹

黃連

錢劉炒伍

白茯苓

砂仁

乾生薑

錢各貳

枳實

半夏

錢洗各伍

厚朴

錢壹兩製

知母

錢炒肆

澤瀉

陳皮

錢各叁

右為末湯浸蒸餅丸如桐子大每服壹百丸食遠白

湯下

中滿分消湯治中滿寒脹寒疝大小便不通四肢厥冷  
食入反出心痞奔豚

益智

半夏

湯洗

茯苓

木香

升麻

各貳錢

川烏

炮

澤瀉

人參

青皮

當歸

酒浸

生薑

麻黃

柴胡

乾薑

炮

葶澄茄

黃連

各貳錢

黃芪

吳茱萸

洗

草豆蔻

煨

厚朴

製各伍錢

黃栢

貳錢

右咬咀每貼壹兩水貳鍾薑參片棗壹枚煎捌分食

後溫服

人參定喘湯治蠱脹有喘

人參

壹兩

杏仁

去皮尖炒壹兩

陳皮

伍錢

木香

叁錢

甘草

伍錢

右為末每服叁錢食遠濃煎蘇木湯調服叁服喘即

止

秘傳諸蟲保命丹

肉蓯蓉

參兩

皂礬

壹斤

紅棗

壹斤煮熟去核

大麥芽

炒壹斤半

香附

壹斤

從蓉皂礬二味入礬內火煨盡烟

右為末麩糊為丸如梧桐子大每服貳拾丸好酒下  
食後服日進參服量人大小用

四炒枳殼丸

枳殼

去穰咀分四分



一分同蒼朮壹兩炒

一分同蘿蔔子壹合炒

一分同乾漆壹兩炒

二分同小茴香壹兩炒

右各炒枳殼黃色為度揀出為細末却將蒼朮等四味用水貳碗煎至半碗去滓攪麪糊和枳殼末為丸如梧桐子大每服參拾丸食遠米飲送下一方治血鼓腹如盆脹

三稜

煨

莪朮

乾漆

炒烟盡

牛膝

去蘆酒洗

蟲虫

糯米炒

琥珀

肉桂

礪砂

水蛭

炙灰  
炒赤

大黃

各等分

右為末用生地黃自然汁和米醋調勻為丸如梧桐子大每服拾丸空心溫酒送下童便下亦可

敷法治腹緊硬如石或陰囊腫大先用甘草煎湯壹鍾服之後用此藥敷

大戟

芫花

甘遂

海藻

各等分

右為末醋糊和藥塗腫脹處

針灸法脾俞二穴

在第十一推下兩傍相去各一寸半隨年壯

肝膈二穴

在

推下兩傍各一寸半隨百壯

分水一穴

在臍上一寸治腹脹統臍結痛灸百壯

三焦膈

二穴

在十三推下兩傍各一寸半治心腹滿腰背痛飲食吐逆小便不利羸瘦少氣

虛腫

虛腫方論

賈洛陽以病瘡不治必為痼疾雖有扁鵲亦莫能為則知腫之危惡非他病比也夫人所以得全其性命者水

與穀而已水則腎主之穀則脾主之惟腎虛不能行  
水惟脾虛不能制水胃與脾合氣胃為水穀之海又因  
虛而不能傳化焉故腎水泛溢反得以浸漬脾土於是  
三焦停滯經絡壅塞水滲於皮膚注於肌肉而發腫矣  
其狀目胞上下微起肢體重着咳喘怔忡股間清冷小  
便澁黃皮薄而光手按成窟舉手即滿是也治法大要  
身有熱者水氣在表可汗身無熱者水氣在裏可下其  
間通利小便順氣和脾俱不可緩耳然而證雖可下又

當權其重輕不可過用羌花大戟甘遂猛烈之劑一發不收吾恐峻決者易固閉者難水氣復來而無以治之也雖然水之為腫特一耳曰風曰氣曰血合而有四焉風腫者皮麓麻木不仁走注疼痛氣腫者皮厚四肢瘦削腹脇脹膨其或煩燥漱水迷忘驚狂嘔逆煩悶皮間有紅縷赤痕者此血腫也婦人經脉壅閉敗血停腐尤多見之然婦人懷胎亦有氣遏水道而虛腫者此但順氣安脾飲食無阻既產而腫自消若產後發虛則虛退

而告殂矣大凡虛腫先起於腹而後散於四肢者可活  
先起於四肢而後歸於腹者不治至若蠱脹而肚上有  
筋腹滿而大便滑泄久瘡而轉作虛浮與夫唇黑傷肝  
缺盆平傷心臍突傷脾足平傷腎背平傷肺皆為不治  
之証當明辯之○男從脚下腫而上女從身上腫而下  
或肉硬或手掌平並不治

虛腫證治

青龍湯治表有水十棗湯量用治裏有水

方詳見  
水飲門

安腎圓多用青木香圓少用貳藥夾和食前溫湯下治

水腫屢效

方見水  
飲門

溫白圓治十種水病積聚脹滿癥癖塊痛久瘡諸風

吳茱萸

盪洗  
次焙

柴胡

北梗

石菖蒲

乾薑

肉桂

黃連

去  
鬚

茯苓

人參

川椒

去目隔紙  
炒出汗

厚朴

製

皂角

去皮  
子炒

紫苑茸

巴豆

去皮膜出  
油各半兩

川烏頭

炮去皮臍  
壹兩半

右細末和勻煉蜜圓桐子大每服參圓食後薑湯下  
加至伍柒圓止治水腫溫白圓用五苓散加炒牽牛  
入些薑汁略煎送下

方見水  
飲門

### 集香湯

沉香

丁香 各貳  
錢

木香

青木香

藿香

川芎

赤茯苓

檳榔

枳殼 製

甘草

炙各  
叁錢

乳香

壹錢  
半

麝香

壹字  
別研



石麝末每貳錢半薑參片紫蘇參葉空心煎服凡虛腫先用諸香以透其關絡然後審證療之

蘿蔔子飲治水病浮腫

蘿蔔子

赤伏苓

生各半兩

牽牛末

炒

葶藶

炒香

甘草

炙各肆兩

半夏

製

川芎

檳榔

辣桂

青皮

陳皮

青木香

白色商陸

各叁錢

右劉每服參錢薑肆片不飢不飽煎服

三和散

方見諸氣門

加縮砂赤伏苓煎吞青木香圓治水蠱

氣脹腹腫腎腫面浮青木香圓乃水腫要藥但酌量用  
或五皮散送下或枳殼散下無熱者沉香降氣湯下  
神助散治水腫

牽牛

炒取末

葶藶

炒香各貳兩半

木猪苓

水浸軟去皮切焙

澤瀉

木香

各壹兩

川椒目

壹兩半

右末先以葱白參莖漿水壹盞煎半盞入老酒半盞

調藥末參錢空心服

行水圓治水腫氣腫

葫蘆巴

炒

故紙

炒

縮砂仁

萆澄茄

真川椒

去目紙上  
炒出汗

烏梅肉

焙乾各  
貳錢半

木香

牽牛

炒取末  
各半兩

巴豆肉

畧去油  
壹錢半

右末稀麪糊圓菴豆大每伍圓食後薑湯下

薑散治胃滿腹腫大瀉不止時或乾嘔

人參

川厚朴

製

草果仁

良薑

苛子

炒

川白薑

生

藿香

丁皮

蒼朮

炒

真橘紅

甘草

炒各  
壹分

木香

肉豆蔻

炮

縮砂仁

伏苓

各壹  
分半

右剉散每服參錢水煎食前服仍以木香縮砂煎湯  
濃調正料參苓白朮散佐之

桑皮飲治肺間積水頭面浮腫

桑白皮

青皮

陳皮

檳榔

枳殼

赤茯苓

青木香

當歸

川芎

石韋

羌活

牽牛

半夏

葶藶

甘草

防風散治風腫皮粗麻木不仁或時疼痛

石劉每參錢薑肆片煎服

麻黃

牽牛

甘草

去節

炒取末

炙各壹分半

炙去毛

各壹分

炒末

炙

炒香

炙各壹分半

杏仁

去皮

防風

半夏

製

芍藥

辣桂

白芷

防己

當歸

川芎

羌活

獨活

檳榔

各壹分

右剉每參錢薑肆片紫蘇參葉煎服

消蠱湯治氣作蠱脹但腹滿而四肢頭面不腫

紫蘇莖葉

縮砂

肉豆蔻

生

枳殼

製

青皮

陳皮

三稜

蓬朮

檳榔

辣桂

白豆蔻仁

葦澄茄

木香

各壹分

半夏

製

蘿蔔子

生

甘草

炙各壹分半

右剉每參錢薑棗煎服

加味枳朮湯治氣為痰飲所隔心下堅脹名曰氣分

枳殼

製

白朮

紫蘇莖葉

辣桂

陳皮

檳榔

北梗

木香

五靈脂

炒各壹分

半夏

製

茯苓

甘草

炙各壹分半

右剉每服參錢薑肆片煎服

調榮飲治瘀血留滯血化為水四肢浮腫皮肉赤紋名曰血分

華陰細辛

莪朮

辣桂

赤芍藥

延胡索

當歸

川芎

白芷

檳榔



大腹皮

桑白皮炒

瞿麥穗

赤伏苓

陳皮

葶藶炒香

大黃

濕紙煨  
各壹分

甘草

炙壹  
分半

右剉每服參錢薑棗煎食前服

續斷飲治血分如前

延胡索

微炒

當歸

川芎

牛膝

川續斷

赤芍藥

辣桂

白芷

五靈脂

炒

羌活

各壹分

赤茯苓

牽牛

炒取末

半夏

製

甘草

炙各壹分半

右剉散每服參錢薑肆片食前煎服

土狗方治遍身腫外腎腫生土狗壹箇手足全者研細入縮砂末等分老酒調下

虛腫方以大香附杵淨以童尿浸壹日夜取出別換童尿又浸壹日夜再取出又換童尿浸壹日夜次以生布錢袋牽擦去皮於臼中搗細用米醋煮飛白麪糊圓桐

子大每服柒拾圓煎和劑流氣飲送下

方見脹滿門

又方

生綠豆

壹合  
張末

橘皮

貳錢

良薑

壹錢  
細剉

右橘皮貳錢良薑壹錢細剉煎湯候冷調綠豆末得所然後略煖連參日空心服

青皮

木香

黃連

橘紅

各壹分

胡椒

壹錢半

右為末入巴豆肉不用去油壹錢麴糊圓胡椒大每

參肆圓薑湯下大便利腫自消未利再服停積痢滯  
通用

又方二十四味大流氣飲壹貼加枳殼壹錢用紫蘇連  
莖叁條截碎燈心壹握生薑柒片大棗貳枚新水壹大  
椀同煎取清汁調蘇合香圓參圓吞溫白圓伍圓效溫

白圓

方見浮腫門

治外腎腫大莖物水泡通明方二十四味流氣飲加白  
芷木通紫蘇煎吞青木香圓百粒效

附諸方

治十種水氣病根源証方法

先從面腫者曰熱水其根在肺

桑白皮為主

先從四肢腫者曰黃水其根在脾

大戟為主

先從背腫者曰鬼水其根在膽

雄黃為主

先從胃腫者曰食水根在皮膚

茯苓為主

先從脇腫者曰飲水其根在肚

芫花為主

先從腰腫者曰肝水其根在胃

甘遂為主

先從腹腫者曰冷水其根在肺 商陸為主

先從陰腫者曰勞水其根在腎 澤瀉為主

先從手腫者曰心水其根在腹 已戟為主

先從腳腫者曰清水其根在心 葶藶為主

右十味為末所主藥加倍餘藥各等分每服壹錢空心井水調服以利為度忌鹽百日外忌魚蝦麪食一切毒物房事病痊後更服調補藥

# 調補藥方

肉桂

乾薑

炮

肉豆蔻

青皮

白朮

川芎

檳榔

桔梗

各等分

右為細末每服參錢食遠白湯調服

神效九治十種水氣

大戟

微炒

澤瀉

葶藶

炒

連翹

桑白皮

木香

炒

甘遂

炒

赤小豆

炒

芫花

醋炒

巴戟

去心已上  
各等分

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服參拾九桑白皮湯送下

道滯通經湯治脾濕有餘氣不宜通面目四肢浮腫

桑白皮

白朮

木香

茯苓

澤瀉

陳皮

各等分

右咬咀每服柒錢水貳盞煎捌分去滓食遠溫服  
香蘇飲治上氣喘嗽面目浮腫



紫苑

紫蘇子

炒各壹錢貳分

大腹皮

烏梅肉

杏仁

去皮尖

五味子

陳皮

桔梗

桑白皮

炙

麻黃

去節

阿膠

炒

甘草

炙各壹錢

服

右吹咀分貳貼每貼水貳盞薑參片煎捌分食遠溫

葶藶丸治肺氣咳喘面目浮腫喘促不安小便赤澀

防己

木通

甜葶藶

紙炒各壹兩

杏仁

去皮尖  
麩炒黃

貝母

煨各  
壹兩

右為末棗肉搗膏為丸如梧桐子大每服伍拾丸食  
遠桑白皮煎湯下

治男子婦人十種水氣取水法

大鯽魚

壹箇去  
腸肚

大戟

甘遂

各貳  
錢半

雄黃

另研  
半錢

木香

牽牛

各半  
錢

右先以大戟同甘遂一半入魚肚裏水濕紙裹煨令  
焦取出焙乾同衆藥為末每服叁貳錢用土狗壹箇

爛研入藥內冷水調下

塗臍膏治腫滿小便少

地龍

豬苓

針砂

各等分

石為末葱涎調敷臍中寸高以帛束之

五皮飲治水氣遍身浮腫宜先此藥數日次服消水丸

伏苓皮

陳皮

生薑皮

大腹皮

桑白皮

加蘿蔔子

蘇子

葶藶子

漢秋子

右四子同炒咬咀每服伍錢水壹鍾生薑參片同煎  
至柒分去滓不拘時服

一方治酒腫及脾虛作腫

蘿蔔

拾枚

皂角

伍斤

右二味用水同煮乾去皂角將蘿蔔搗爛入蒸餅和  
丸如雞頭實大蘿蔔子煎湯如意送下

一方治水腫氣蠱

木香

檳榔

陳皮

青皮

大戟

甘遂

肉豆蔻

各甌錢半

牽牛

末壹兩半

右為末水丸或商陸汁丸如菰豆大每服伍拾丸空

心白湯下

三花神祐丸治一切水濕腫病大腹實脹喘滿舟車丸

方見

濕門

針灸法分水一穴

在臍上一寸灸七壯療腹腫不能食若是水病灸大良

神闕一

穴

當臍中灸三壯主水腫陂脹腸鳴如流水聲

石門一穴

在臍下二寸灸七壯主水脹水氣行

皮中小便  
黃氣滿

三里二穴


在膝下三寸斷外廉兩筋  
間灸七壯主水腹脹皮腫

水溝名

人中

在鼻樑下灸三壯  
主水腫人中滿

水腫惟得針水溝若針餘穴水盡即死此明堂銅人  
所戒也庸醫多為人針分水殺人多矣若其他穴亦  
有針得瘥者特幸焉再不可為法也



仁齋直指卷十七

# 欽定四庫全書

子部

仁齋直指卷十八

詳校官太醫院八品吏目<sub>臣</sub>黃發

編修<sub>臣</sub>倉聖脈覆勘

覆校官中書<sub>臣</sub>朱鈐

校對官主簿<sub>臣</sub>汪日贊

謄錄監生<sub>臣</sub>張紹鼎



欽定四庫全書

仁齋直指卷十八

宋楊士瀛撰

明朱崇正附遺

身體

身疼方論

凡人百骸四體肌肉皮膚關節脈絡總而謂之身風淫濕滯血刺痰攻皆能作痛至於骨之酸疼或寒或熱入裏徹骨則倍從千萬太不侔焉蓋骨為髓之藏髓者飲

食五味之實秀也髓虛則骨虛勢所必至矣痛在於身  
風之證以走注知之濕之證以重着驗之血有筋脈錯  
刺之證痰有眩暈咳唾之證驅風除濕行血豁痰對證  
一投猶冀可以旦暮起病入於骨此勞極損傷之不可  
救藥者也其能生乎然則身痛之與骨痛毫釐千里之  
差於此不可以無辯雖然酒家之癖多為項腫臂痛蓋  
熱在上焦不能清利故醞釀日久生痰涎聚飲氣流入  
於項臂之間不腫則痛耳然而曰痰曰涎曰飲又有理

一分殊之別伏於包絡隨氣上浮客肺壅嗽而發動者  
痰也聚於脾元隨氣上溢口角流出而不禁者涎也惟  
飲生於胃府為嘔為吐此胃家之病學者不可不知

### 身疼證治

人參順氣散身疼通用

方見風類

更增川芎半兩亦散風邪

左經圓麝香圓增味五痺湯治風濕身痛

並見風類

加劑除濕湯生附除濕湯

方見濕類

五苓散

見水飲類

並主傷濕

身痛

黃耆建中湯

方見濕類

加川芎當歸治血刺身痛

大半夏湯

方見痰涎類

加辣桂陳皮治痰證身痛

消痰茯苓圓治臂痛不能舉手或左右轉移或兩臂如人抽拽

圓白半夏

盪洗三次切碎日乾一兩半

茯苓

一兩

風化朴消

一分

枳殼

麤炒半兩

右末薑汁煮稀麤糊圓桐子大每三十圓食後薑湯

下

天仙飲治痰注臂痛

片子薑黃

六錢

天仙藤

羌活

白朮

白芷梢

各三錢

半夏

製半兩

右挫每服三錢薑五片煎服間下千金五套圖

方見脾疼

類

白圓子諸風痰涎通用

圓白半夏

七兩生水浸洗過

南星

三兩

白附子

生二兩

川烏頭

生去皮臍半兩

右細末入生絹袋井水擺以手揉出滓再研入袋擺  
盡磁盆中曬露星至曉棄舊水換新水攪曬次早又  
換新水攪曬春五日夏三日秋七日冬十日去水曝  
乾研開糯米粉煎粥清圓菜豆大每三十圓薑湯下  
治酒家痰壅項腫白圓子二錢研末白豆蔻縮砂煎  
湯調下化痰立愈自後二陳湯加荊芥服

方見  
癰類

娑蒿根酒治風淫濕滯手足不舉筋節攣疼先與通關

用

全蝎

七箇新瓦上  
微炒末之

麝

一  
字

右老酒三盞空心調作一服如覺已透則止未透次日再作一劑然病未盡除自後專以婆蒿根洗淨切碎酒煎日二服神效

消飲圓倍末圓治酒癖停飲臂痛

見水  
飲門

沉香蠶甲散治勞倦身痛

沉香

人參

牛膝

茯苓

秦艽

木香

黃耆

微炙

已戟

去心

當歸

半夏

製

柴胡

荊芥

各半兩

熟附子

辣桂

去粗皮

鱉甲

浸去裙醋炙黃各一兩

羌活

熟地黄

洗酒蒸焙七錢半

全蝎

二錢半

大肉豆寇

四箇

右末每二錢葱白二寸薑三片棗二枚食前煎服溫

酒調下尤妙

十補湯加製半夏添桂治勞倦身痛

方見癰冷門



舒筋散治風淫血刺身痛體疼痛四肢拘攣

延胡索

炒

辣桂

去粗皮

當歸

等分

右末每二錢酒調下延胡索活血除風理氣

補髓丹補益真元治臂痛腰痛

杜仲

去粗炒黑十兩

破故紙

十兩用芝麻五兩同炒候芝麻黑篩去之

鹿茸

二兩酒炙

沒藥

一兩別研

右細末用胡桃肉三十箇湯浸去皮杵為膏入麵少

許酒煮糊圓桐子大每百粒空心鹽湯下

附諸方

通氣防風湯

拔粹方

肩背痛不可迴顧者此太陽氣鬱而

不行以風藥散之背痛項強腰似折項似拔者此足太陽經不通也

羌活

獨活

各一錢

藁本

防風

甘草

各半錢

川芎

荆芥

各三分

右咬咀水煎服

麒麟竭散治寒濕搏於經絡以致氣血凝滯疼痛不可忍者

血竭

乳香

沒藥

白芍藥

當歸

水蛭

炒令烟盡

麝香

各二錢

虎脰骨

酥炙黃半兩

右為末每三錢溫酒調下食前

當歸拈痛湯

拔粹方

治濕熱為病肢節煩痛肩背沉重胸

膈不利及遍身疼痛下疰於足脛痛腫不可忍

方見脚氣門

丹溪方治上中下疼痛

南星

薑製

蒼朮

酒洗

黃柏

酒炒各二兩

川芎

一兩

白芷

半兩

神麴

炒一兩

桃仁

半兩

威靈仙

酒炒三錢

羌活

三錢走骨節

防己

半兩下行

桂枝

三錢行臂

紅花

酒洗錢半

草龍膽

半錢下行

右為末麪糊丸梧子大每服一百丸空心白湯下

一方治血氣虛有痰白濁陰火痛風

人參

一兩

白朮

熟苧

川黃栢

炒黑各二兩

山藥

海石

南星

各一兩

鎖陽

半兩

敗龜板

酒炙二兩

乾薑

燒灰半兩取其不走

右為末粥丸一云酒糊丸

一方治酒濕痰痛風

黃栢

酒炒

威靈仙

酒炒各五錢

蒼朮

羌活

甘草

三錢

陳皮

芍藥

各一錢

右為末每服一錢或二錢沸湯入薑汁調下

諸風應効酒治一切諸般風氣濕痺通身骨節疼痛

方見風門

腰

腰痛方論

腰者腎之外候一身所恃以轉移闔闢者也蓋諸經皆貫於腎而絡於腰脊腎氣一虛凡衝風受濕傷冷蓄熱血滯氣滯水積墮傷與夫失志作勞種種腰疼疊見而

層出矣衝風者汗出乘風風邪風毒之胚胎也受濕者  
踐雨卧濕重著腫滯之萌蘖也腰間如水為傷冷發渴  
便閉為蓄熱血滲則轉側如錐之所刺氣滯則鬱鬱悶  
悶而不伸積水沉重則小腸不得宣通墜墮損傷則瘀  
血為之凝結沮剋失志者腎之靈疲精勞力者腎之戕  
舉是數證腎家之感受如此腰安得而不為痛乎內經  
曰腰者腎之府轉搖不能腎將僊矣審如是則痛在少  
陰必究其受病之原而處之為得雖然宗筋聚於陰器

肝者腎之同系也五臟皆取氣於穀脾者腎之倉廩也鬱怒傷肝則諸筋縱弛憂思傷脾則胃氣不行二者又能為腰痛之寇故併及之

腰痛證治

青娥圓治腎虛腰痛益精助陽烏鬚壯脚用安胎飲吞神效

破故紙

四兩炒香

杜仲

去粗剉四兩用生薑二兩半擦淹炒乾

右為末用胡桃肉三十箇研膏入少熟蜜圓桐子大



每服五十圓調氣散食前下

方見脹滿門

安腎圓治腎虛腰痛橘皮煎湯食前下

方見水飲門

獨活寄生湯治風邪冷濕傷腎腰脚背痛及新產腹痛腰脚攣疼最除風活血脚氣通用

獨活

二兩半

桑寄生

如無以續斷代之

杜仲

薑製炒

細辛

牛膝

酒浸焙

秦朮

去蘆

茯苓

白芍藥

辣桂

川芎

防風

人參

當歸

熟地黄淨

甘草

炙各二兩

右細剉每服三錢空心煎服下利者去地黄

小續命湯治風攻腰痛

方見諸風門

加桃仁去皮尖炒

生附湯治受濕腰痛

附子

生一分

蒼朮

炒

杜仲

薑製炒各半兩

生乾薑

白朮

茯苓

牛膝

酒浸焙

厚朴

製

甘草

炙各一分

右判每三錢薑四片棗二枚食前煎服

薑附湯治傷冷腰痛

方見寒類

加辣桂製杜仲食前煎服

甘豆湯治內蓄風熱入腎腰痛大小便不通

方見積熱門

加

續斷天麻間服敗毒散

方見寒類

蘇沈沉麝圓治血滯腰痛

方見血類

用續斷牛膝桃仁炒煎

湯磨下

人參順氣散烏藥順氣散治氣滯腰痛

方見諸風類

加五加

皮八少甘草煎湯調下

腎着湯治腰間積水痛重

方見濕門

續用安腎圓并少許青

木香圓繼之

方見水飲門

乳香趁痛散治打墜腰痛

虎脛骨

酒炙黃

敗龜

酒炙各二兩

騏驎竭

赤芍藥

當歸

沒藥

自然銅

煅醋淬細研

防風

白附子

炮

辣桂

去粗

白芷

蒼耳子

微炒

骨碎補

炒去毛各三兩

牛膝

天麻

檳榔

五加皮

羌活

各一兩

右末每服一錢溫酒調下加全蝎妙脚氣通用

茴香酒治打墜凝瘀腰疼通用

破故紙

炒香研

茴香

炒

辣桂

等分

右為末每服二錢熱酒調食前進故紙主腰痛主行血

和劑七氣湯治失志傷腎氣剝腰痛

方見氣類

多加白茯苓

少加沉香乳香

麝香鹿茸丸八味丸治房勞傷腎腰痛十補湯下青娥

丸治勞力腰痛

三方見  
痼冷門

調肝散治鬱怒傷肝發為腰痛

半夏

製三分

辣桂

宣木瓜

當歸

川芎

牛膝

好細辛

各二分

石菖蒲

酸棗仁

盪去皮  
微炒

甘草

炙各一分

右剉細每三錢薑五片棗二枚煎服

沉香降氣湯和調氣散每服二錢半薑棗煎治憂思傷

脾發為腰痛

方見諸氣門

續香丸治腰痛經久不瘥

橘核

茴香

葫蘆巴

菴藺子

破故紙

各炒

附子

炮等分

右末酒煮糯米糊圓桐子大每服三四十圓食前鹽

湯下

神麴酒治腰痛不能轉側陳久神麴一大塊燒通紅淬

老酒去神麴通口吞青娥圓兩服頓愈

腰重痛方

八角茴香炒末食前溫酒調下

附諸方

獨活湯治因勞役得腰痛沉重如水似折

羌活

防風

獨活

肉桂

大黃

煨

澤瀉

三錢

桃仁

五十箇

當歸

連翹

半兩



甘草

二錢

防已

酒連

一兩

右咬咀水一盞酒一盞煎至一盞去滓通口食前服

補髓丹

百一選方

升降水火補益心腎強筋壯骨治腎虛腰

痛

方見身體門

若濕腰痛如坐水中蓋腎屬水久坐水濕處或為雨

露所着濕流入腎經以致腰痛宜滲濕湯不効宜

腎着湯

若風傷腎而腰痛者或左右痛無常處牽引兩足宜

五積散每服加防風半錢或加全蝎三箇小續命湯獨活寄生湯可選而用

經驗羌活桃仁湯治墜墮挫閃氣血凝滯攻刺腰痛神効

桃仁

去皮尖

紅花

牛膝

酒洗

玄胡索

破故紙

炒

杜仲

炒

川歸尾

酒洗

羌活

官桂

蒼朮

泔浸炒各等分

茴香

乳香

少許

右咬咀用水一鍾酒半鍾煎至八分食前溫服

補陰丸治腎虛腰痛

方見虛勞門

牛膝酒

三因方

治腎傷於風毒攻刺腰痛不可忍者

地骨皮

五加皮

薏苡仁

川芎

牛膝

各二兩

甘草

一兩

生地黄

十兩

海桐皮

二兩

羌活

一兩

右咬咀用絹帛裹藥入無灰酒內炙浸七日夏三五宿每服一盃日用三四服長令酒氣不絕一法加炒

杜仲

一兩

杜仲酒

三因方

治風冷傷腎腰痛不能屈伸

杜仲

一兩去粗皮用姜汁製炒

右用無灰酒三升浸十日每服二三合四五服

針灸法腎俞二穴

在十四椎下兩旁各一寸半

一法

令患人正立用竹杖度臍點記度皆

虛處灸隨年壯

腎氣

腎氣方論

腎主納氣人之氣海繫焉腎虛而為風寒所乘為暑濕

所襲為喜怒憂恐所傷而水結不散又與氣搏是以群邪聚於其中曰疝曰奔豚曰小腸氣曰膀胱氣皆是物也其候不特外腎小腹作痛或攻刺於腰脇或遊走於背脊或冷氣搶心心下痛滿或手足厥冷痛繞臍傍或脇之左右如盂或臍之上下如臂或腹中累累如桃李或胃脘間覆大如盤有壯熱惡寒者有洒淅寒熱者有不得大小便者有裏急而下泄者有自汗出者有不欲食者其於陰間則卵有大小伸縮而上下不常囊有腫

脹急痛而發歇無定挾冷觸怒則塊物逼上囊根或攻  
腹脇時和心平則塊物自循脣系歸入囊中凡此皆謂  
之腎氣治法綱領風則散之寒則溫之暑則解其熱濕  
則滲其水七情所發調其心氣水與氣搏行其小便其  
間以主治腎氣之劑參之固定則也然總治之法大要  
以流行踈利為先母曰腎虛得病不敢踈泄蓋腎為邪  
氣所干若非逐去病何由愈儻或姑息畏虛妄以剛劑  
兜住使大小腑秘而不通邪氣入腹衝心危殆必矣雖

然腎氣發作固以腎虛得之然虛中有冷虛中有熱又有  
冷熱不調尤當詳審冷者脇邊及外腎清冷小便清而多  
遇寒即發是也熱者內挾暑氣或積酒毒或服煖藥於前  
外腎與小腹俱熱肛門間糞後亦熱小便數而澀遇熱則  
甚是也冷熱不調者小腹外腎乍冷乍熱大便小便或  
秘或利用藥溫涼當隨證而權度之但所謂流行疎導常  
常運幹於其中矣其若大小便流利之後或更有牽刺引  
疼或微氣遊注於肌膚之間此則腎虛血虛氣不還元當

加潤養人參當歸川芎芍藥桑螵蛸葫蘆巴輩又不可無  
惟是逆氣長噓中脘停酸燥悶擾擾甚而至於嘔吐最為  
惡候何則天一生水腎實主之宗筋聚於陰器惟藉陽明  
以養之今脾土不濟腎水上乘必為酸汁必為涎飲荏苒  
踰時遂成暴吐醫家執劑之始皆知腎經惡燥如蒼朮白  
朮良薑之類誠不敢發用耳及其嘔吐大作薑朮輩用之  
而不顧若猶未也則吳茱萸草撥剛燥等劑又加多焉雖  
附子亦用之而救急矣病勢至此脾土未強腎水已為之



潤腎水既潤脾土又為之焦往往陰陽不升降榮衛不流行大小二便關隔澀閉而腎汁胃汁皆自其口出也如此者大抵不救臨病須當識證預與病家言之

腎氣證治

牡丹丸治風寒疝痛及諸血滯作痛

牡丹皮

四兩

桃仁

浸去皮炒別研

官桂

各五兩

川烏頭

一隻炮熟去皮尖

右末煉蜜圓桐子大每服五十圓溫酒下血痛醋湯下

養正丹

方見痢冷門

治奔豚氣痛嘔吐身冷調氣散下

沈附湯治腎虛無陽小腸氣痛頭額小腹外腎時冷兼

治濕證

附子

生一錢

沈香

辣桂

萆澄茹

甘草

炙各半錢

香附

一錢

右剉為一服薑七片空心煎服

桂薑湯治無陽臍冷疝氣兼治濕證

吳茱萸

十兩半酒醋浸一宿焙乾

川白薑

生

辣桂

各半兩

良薑

草澄茄

茴香

炒

縮砂仁

益智仁

木香

茯苓

甘草

炙各三錢

右判每服三錢水煎調蘇合香丸食前服

薑桂丸治腎冷寒疝

良薑

碎片半兩

巴豆肉

二十一粒截斷同炒焦去巴豆

桂心

半兩

右並末醋麪糊圓桐子大每三十九溫酒食前服

茴香雀酒治腎冷疝氣偏墜急痛

舶上茴香

三錢

胡椒

一錢

縮砂仁

辣桂

各二錢

右粗末以生雀燎毛去腸拭淨不洗用三箇入藥於腹中麻繩繫定濕紙數重裏煨香熟空心嚼食溫酒送下

川椒散治疝氣外腎腫痛

真川椒

去目并合口者微炒出汗

官桂

各半兩

川芎

當歸

青皮

陳皮

製

枳殼

檳榔

赤茯苓

青木香

南木香

華澄茄

白豆蔻仁

甘草  
炙各一分

右粗末每三錢薑棗煎食前服

梔子散治腎氣虛中有熱小腹外腎肛門俱熱大小便不通

梔子仁

製

枳殼

各半兩

北梗

北前胡

青木香

赤茯苓

車前子

甘草

各一分

右剉每三錢新水煎服壯熱加柴胡大便秘加大黃  
甘豆湯治腎氣虛中有熱大小便不通

黑豆

合三

甘草

剉二錢

薑

片七

右作一劑新水煎取清汁服

海浮石散治腎氣熱證小便秘澀黃色

海浮石

右為末每二錢煎麥門冬赤茯苓湯調下

金蓮散治膀胱氣痛

巴豆

三十粒 去殼斷

川練子

二十四箇湯浸去皮薄切片

右件用麩二合同炒令黃赤去麩與巴豆只將川練為末每二錢溫酒調空心服

五苓散

方見水飲門

用生車前子竹園尿赤茯苓麥門冬去

心燈心烏梅煎湯調下治腎氣小便不通兼治水結不散暑證通用

柴胡桂枝湯治腎氣冷熱不調證

柴胡

一兩三錢

人參

桂枝

白芍藥

生薑

各半兩

半夏

藥四錢

黃芩

甘草

炙各三錢

右剉散每服四錢棗一枚水大盞煎七分溫服

解毒雄黃丸

方見積熱門

溫白丸

見浮腫門

以枳殼散送下

方見腳氣

門治腎氣大便不通酌量輕重用

二物湯治奔豚疝氣攻刺走痛

辣桂

一兩半

牽牛

炒一兩

右粗末每服二錢薑棗煎溫服



青木香丸治膀胱疝氣每五十丸以醇酒入葱白煎五

苓散送下

方並見水飲門

又方青木香圓二百粒班猫七箇去

頭足翹為末同於文武火上慢慢炒令丸子微香以磁  
碟蓋銚上頓在冷處少頃去班猫末取圓子每服五十  
丸茴香酒下

金鈴散治膀胱小腸氣外腎腫痛

大川練子

三十箇湯浸去薄皮每箇作六七片巴豆三十粒去皮膜每粒作兩三段夾炒

候巴色焦去巴

右以舶上茴香與川練等秤并木香一分為末每二錢水酒各半盞連根葱白二寸煎取汁食前調下

煨棗方治小腸氣痛不可忍班猫一箇去頭足翅入大棗中線繫濕紙包置慢火中煨令香熟去猫空腹食棗以桂心葷澄茄煎湯送下

蝎麝散治膀胱小腸氣痛全蝎緊實而全者不拘多少焙乾為末每迎病發時用蝎末一錢入麝半字分作二服溫酒調下人行十里又進後服神効

失笑散治小腸氣痛及諸血痛

川五靈脂

蒲黃

隔紙微炒

加延胡索

各等分

右末每服二錢酒半盞水半盞煎七分食前服血痛  
臨熟入米醋少許

鹽煎散治小腸氣吊腹中成陣刺痛兼治風證

益智仁

白芷

白乾薑

炮

茴香

炒

甘草

炙

天台烏藥

去心

香附

淨各一兩

青皮

一兩半

檳榔

麻黃

去節

川芎

枳殼

製各半兩

右末每服二錢鹽少許水煎食前服

全蝎延胡散治小腸氣痛最良

延胡索

用鹽炒一兩

全蝎

日乾生用一分

右細末每服一錢食前溫酒調下亦治心痛不饑飽

醋湯調下

葫蘆巴散治小腸氣攻刺

葫蘆巴

炒一兩

右末每服二錢茴香炒紫用熱酒沃蓋定取酒調下  
葱白散治腎氣刺痛七氣通用

當歸

川芎

枳殼

製

官桂

青皮

川白蘆

生

茴香

炒

川練肉

陳皮

紫蘇

三稜

煨

蓬朮

醋浸一宿焙

白芍藥

茯苓

木香

各一兩

人參

沈香

甘草

炙各半兩

右粗末每服三錢葱白二寸鹽少許煎服大便秘加大黃

寸金圓治奔豚諸症作痛

當歸

延胡索

舶上茴香

炒

葫蘆巴

炒各一兩

桃仁

浸去皮焙

桑螵蛸

酒蒸焙

川五靈脂

別研

白芍藥

川練肉

各半兩

萆澄茄

木香

二錢半

全蝎

十箇焙

右末米醋打麵糊圓桐子大每服五十圓少鹽入酒送

下有熱小便秘車前子赤茯苓煎湯下

生料調氣散治寒疝作痛

方見諸氣門

每服二錢入生薑紫

蘇少鹽煎服若是藥末用茴香鹽酒調下

秘傳茱萸內消圓治腎虛為邪所襲留伏作痛陰癰偏

大或生瘡出黃水

吳茱萸

半酒半醋浸一宿焙乾

山茱萸

蒸去核

馬蘭花

醋浸焙

川練子

蒸去皮核

官桂

黑牽牛

炒取末

舶上茴香

用鹽炒

延胡索

畧炒

橘紅

青皮去白

海藻浸洗去鹹焙各一兩

桃仁浸去皮炒

白蒺藜炒杵去刺

木香各半兩

右細末酒麴稀糊圓桐子大每四十圓食前溫酒鹽

湯任下

葫蘆巴丸治腎經虛冷膀胱氣痛或陰腫偏墜或小腹有物如卵上下走痛

葫蘆巴炒

川練子蒸去皮核焙各四兩

川烏炮去皮臍

大巴戟去心各一兩半  
茴香炒三兩



吳茱萸

半酒半醋浸一宿焙乾二兩半

牽牛

炒取末二兩

右為末酒麪稀糊圓桐子大每二十圓空心溫酒送

下

蠲痛圓治小腸膀胱氣痛

延胡索

畧炒一兩

川練

蒸去皮核

舶上茴香

炒各半兩

牽牛

炒取末

當歸

良薑

青皮

去白

木香

天台烏藥

各一分

全蝎

七箇焙

右末生薑自然汁浸糕為糊圓桐子大每服三十圓  
燒綿灰存性調酒送下

腰子散治腎氣作痛

黑牽牛

炒熟

白牽牛

炒熟  
等分

右為末每服挑三錢匕猪腰一副薄切開縫入川椒  
五十粒茴香一百粒以牽牛末徧摻入腎中線繫濕  
紙數重裏煨香熟出火氣燈後空腹嚼喫好酒送下  
少頃就枕天明取下惡物即愈

茯苓桂甘湯治臍下悸動欲作奔豚

茯苓

二兩

甘草

炙半兩

桂枝

一兩

右剉細每服四錢棗一箇用甘泉水一盞半煎一盞溫服

敵金圓治疝氣外腎腫脹極大或生瘡出黃水其痛遶腹寒熱往來

京三稜

蓬莪朮

木豬苓

白附子

蘿蔔子

赤芍藥

黑牽牛

川練肉

山茵陳

青木香

陳橘皮

五靈脂

薑黃

茴香

各一兩

南木香

半兩

丁香

一分

澤瀉

一兩半已上並生用

海藻

酒浸一宿焙乾

海浮石

米醋浸火煨紅淬醋又煨淬如此七次黑為度

川山甲

熟大灰煨焦各一兩

青皮

去白二兩一兩生用一兩截碎以班貓不用十箇去頭足翅同炒黃色去班貓不用

香附

杵淨二兩一兩生用一兩以已豆五粒去殼同炒色焦去已豆不用

右件截碎夾和微炒並為末酒麴稀糊圓桐子大每

服三十圓溫酒送下此藥能泄斟酌用之

川練散治膀胱小腸氣木腎諸疝通用

方具木腎門

金山老艾瓜丸治腎氣攻刺及脚氣酸疼通用皆得効

葫蘆巴

慢火炒

牛膝

酒浸焙

舶上茴香

酒浸炒

肉蓯蓉

酒浸焙

川續斷

揀淨生用

厚杜仲

去粗皮蘆製炒令絲斷

天麻

各二兩

當歸

酒浸焙

沒藥

別研各一兩

右為末以艾去枝梗二兩大木瓜二枚切蓋去穰入

艾塞蒲蓋定竹針插麻線繫蒸爛研細和藥為丸桐  
子大每服七十圓溫酒鹽湯任下

腎氣方大七氣湯加炒牽牛煎服

又方生薑母多開小孔納以川椒濕紙煨透老酒嚼下

附諸方

川練子散治小腸氣痛

木香

不見火

茴香

鹽炒黃  
去鹽

川練子

用已豆十粒搥碎同川練  
炒黃色去已豆各一兩

右為末每服二錢溫酒空心食前調服

玄胡索散治小腸氣痛

用玄胡索鹽炒乾薑各等分為細末空心鹽酒調下

腎氣方

丹溪方

治諸疝定痛

茴香

破故紙

吳茱萸

鹽炒各五錢

葫蘆巴

七錢半

木香

三錢半

右為末蘿蔔搗汁丸鹽湯下

守効丸治癰疽要藥不痛者

蒼朮

南星

白芷

散水

山查

各一兩

川芎

枳殼

又云枳實炒

半夏

各半兩

秋冬加吳茱萸

右為末神麴糊丸服又云有熱加山梔一兩堅硬加

朴硝半兩又或加青皮荔枝核

又方治癰疽

南星

山查

蒼朮

各二兩

白芷

半夏

製

枳核



神麴

各一兩

海藻

半兩

昆布

半兩

玄明粉

吳茱萸

各二錢

右為末酒糊丸

積疰方

山查

炒一兩

茴香

炒

柴胡

炒二錢

牡丹皮

一錢

右為末酒糊丸如梧子大服五六十丸鹽湯下

又方治疰作痛

蒼朮

香附

俱鹽炒

黃柏

酒炒已上為君

玄胡索

益智仁

桃仁

已上為臣

茴香

炒

附子

鹽剉炒

甘草

已上為使

右為末作湯服後一痛過更不再作矣

治偏墜用沒藥川練肉角茴全蝎為末每服二錢空心熱酒調下

木腎

木腎方論

心火下降則腎水不患其不溫真陽下行則腎氣不患其不和溫溫其和安有所謂木强者哉惟夫嗜慾內戕腎家虛憊故陰陽不相交水火不相濟而沉寒痼冷凝滯其間脹大作疼頑痺結硬勢所必至矣執劑之法不可純用燥熱當溫散溫利以逐其邪邪氣內消榮衛流通益如寒谷回春蓋有不疾而速不行而至者矣外此又有一種升高墜下外腎跌傷驚氣與敗血交攻亦有木強脹痛之證治法大要則同於中更為之消瘀

木腎證治

川練散治外腎脹大麻木痛硬及奔豚疝氣偏墜諸證

川練子

不蛀者四十九箇先切七箇取肉以茴香二錢半慢火同炒併留茴香又切七箇以破故紙二錢半同炒併留故紙又切七箇以鹽一錢同炒併留鹽又切七箇以班貓十四箇去翅同炒去班貓不用又切七箇以巴豆肉十四箇作兩斷同炒去巴豆不用又切七箇以蘿蔔子二錢半同炒去蘿蔔子不用外更別入

茴香

炒

青木香

各半兩

辣桂

南木香

各二錢半

右並為末酒調稀麪糊圓桐子大每服三十圓食前  
鹽酒下積日計功打墜瘀血證本方加延胡索半兩  
畧炒入藥以沒藥研為末調酒下

金鈴散煨棗方治膀胱小腸氣痛外腎脹大通治木腎

方見腎  
氣門

四神丸治腎冷疝氣脹痛

吳茱萸

揀淨一兩一半用老酒浸一宿  
一半用米醋浸一宿各焙乾

大香附

杆淨  
一兩

萆澄茄

青木香

各半  
兩

右為末米糊圓桐子大每服七十圓食前鹽湯下或  
乳香葱白煎湯下

附諸方

一方治木腎不痛

枸杞子

南星

半夏

黃栢

酒炒

蒼朮

鹽炒

山查

白芷

神麴

炒

滑石

昆布

吳茱萸

右為末酒糊丸桐子大空心鹽湯下七十丸

治小腸氣及木腎偏墜方

黑牽牛一斤用猪尿胞裝滿以線縛定口子好酒米醋各一碗於砂鍋內煮乾為度取去黑牽牛用青紅娘子十九箇於鉄鍋內炒燥去青紅娘子將牽牛研取頭末四兩另入猪苓澤瀉細末各二兩醋糊丸如梧桐子大每服三十九空心鹽酒送下不可多服如多服令人頭眩如頭眩可服黑錫丹

奪命丹

和濟方

遠年近日小腸疝氣臍下撮痛外腎偏墜

腫硬陰間濕痒抓成瘡癬

吳茱萸

一斤酒浸四兩醋浸四兩湯浸四兩童便浸四兩各浸一宿用火焙乾

澤瀉

去灰十  
一二兩

右為末酒煮麵糊丸如梧子大每服五十九溫酒鹽

湯任下

一方治木腎

楮樹葉

又云楊樹

雄者晒乾為末酒糊丸桐子大空心鹽



湯下五十九

仁齋直指卷十八

欽定四庫全書

仁齋直指卷十九

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

腎臟風癢

腎癢方論

實則為痛虛則為癢癢之出於骨虛也明矣腎屬足少陰之經囊間濕癢謂之腎臟風世所共知也孰知宗筋聚於陰器足厥陰之肝系焉惟腎主虛惟肝主風人之

精血不充內為嗜慾所耗外為風冷所乘風毒濕氣皆從虛入囊間其有不濕癢者乎脚下其有不瘡瘍者乎療治之法先當疏散風邪流行濕毒夫然後以芎歸活血與細辛疾藴驅風數輩潤養而平治之若欲遽用川烏故紙燥烈之劑吾恐攔住內邪病無由愈間有患者為酒麪炙燂所傷腎虛而挾熱如猪肚黃連蒸為圓子又不可無其或不施藥餌一切從事於熱湯雖沃之暫止然真氣愈泄肝腎愈虛或者未知攸濟

腎癢證治

宣風散踈肝腎風

大雞心檳榔

二箇橘皮半兩

牽牛

生取末一兩炒取末一兩

甘草

焙三錢

右末每服二錢蜜湯調下

不換金正氣散去肝腎濕氣

方見傷寒類

青木香圓踈導腎經風水

方見水飲門

病人腎虛挾邪浮腫

多用安腎圓少用青木香圓夾和鹽湯下屢效安腎圓

方見水  
飲門

活血驅風散治肝腎風毒腎囊濕癢脚下瘡癬

當歸

川芎

白芷

華陰細辛

白蒺藜

炒去刺

桃仁

浸去皮焙

白芍藥

半夏

製

塊潤

五靈脂

甘草

生各三錢

蒼朮

炒

杜仲

鹽汁炙炒去絲

辣桂

天麻

薏苡

橘紅

檳榔

厚朴

製

枳殼

製

右細剉每服三錢水盞半薑錢五片棗二枚煎七分  
濾清煖熱入乳香末少許食前服乳香以佐心氣使  
心腎相交或有熱證去乳香加黑豆煎

疾藥散治癰風上攻耳鳴目眩下注陰濕瘡癢

疾藥

炒杵  
刺

草烏頭

水浸三日逐日換  
水去皮晒各半兩

白芷

白附

生

蒼朮

炒

荆芥穗

各二  
錢半

右豨耒米糊圓桐子大每三十圓上則茶清下則鹽

酒服

烏荊圓治肝腎風癢

方見腸風門

神授圓治外腎濕癢

方見虛勞門

莖物腫爛淫汁方

大腹皮

一斤

右炙苦參荊芥煎湯溫洗拭以津唾塗次用油髮燒存性入些白及末傳逐日煎湯密室洗換藥或用乳



香龍骨散仍服蠟礬圓并髮灰用米飲調下

莖頭三五孔小漏瘡出血微膿妙方

油髮燒存性灰傳乾則津唾調仍以米湯調髮灰

食前服

乳香龍骨散治外腎濕癢淫爛如瘡

龍骨

石膏

生

五倍子

各一分

白及

乳香

黃革丹

各半分

麝

少許

右細末先以苦參大腹皮紫蘇莖葉煎湯溫洗後傳

陰汗濕癢方

爐甘石

綠者一分

真蚌粉

黃連

五倍子

各半分

右細末摻先以蜂房大腹皮煎湯溫洗

又爐甘石方

見諸瘡門

妬精瘡陰蝕瘡方

油髮灰

青黛

乾等分

右為末入些麝或摻或津唾調傳

又青紙方

見妬精  
瘡中

大學治腎臟風發瘡疥方

雞心檳榔

一大箇破開以黃草月  
一錢合在內濕紙裏煨

明硫黃

研二錢

生革丹

一錢

全蝎

右同末入輕粉半錢麝少許於磁器收每用少許麻  
油調抹兩掌先以鼻臭男以兩掌揜外腎女以兩掌  
掩兩乳各睡至醒次日又如此用藥屢效

又方用大紅川椒去目水蘸濕半日夾生杏仁研膏擦手如上法亦驗

附諸方

龍膽瀉肝湯治陰部時復濕癢及臊臭

柴胡

澤瀉

各一分

車前子

木通

各五分

生地黃

當歸尾

草龍膽

各三分

右件咬咀如麻豆大都作一服水三大盞煎至一盞

去滓稍熟空心宿食消盡服之更以美膳壓之

柴胡勝濕湯治兩外腎冷兩脾樞陰汗前陰痿陰囊濕

癢臊氣

生甘草

酒黃柏

錢各二

柴胡

當歸尾

錢各一

紅花

許少

草龍膽

麻黃根

羌活

漢防已

錢各一

五味子

錢三

升麻

澤瀉

錢各一  
半

茯苓

錢一

右件劉如麻豆大都作一服水三大盞煎至一盞去滓溫服食前忌酒濕麪房事

補肝湯

東垣方

前陰如冰冷并陰汗兩脚痿軟無力

黃耆

七分

人參

葛根

白茯苓

各三分

升麻

四分

柴胡

羌活

當歸身

連翹

炒黃蘗

澤瀉

蒼朮

麴末

知母

防風

陳皮

各二分

炙甘草

半

猪苓

四分

右件剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去滓  
稍熱服空心食前忌酒濕麵

一方治腎囊濕瘡

蜜陀僧

乾薑

滑石

右為末擦上

又方先用吳茱萸煎湯洗

吳茱萸

半兩

寒水石

三錢

黃柏

二錢

樟腦

蛇床子

半兩

輕粉

硫黃

二錢

白礬

檳榔

白芷

各三錢

右為末麻油調搽

頭風

頭風方論

足太陽者頭之經也六經傷寒惟太陽受病最多蓋頭居其上當風寒之衝一有間隙則若項若腦若耳若鼻



風邪乘虛皆得而入之矣况復櫛沐取涼飽食仰卧之不謹乎頭風為病不必須有偏正頭疼之證但自頸項以上耳目口鼻眉稜之間或有一處不若吾之體焉皆其漸也有頭疼有頭運有頭皮頑厚不自覺知有口舌不仁莫知滋味或耳聾或頭汗或目痛或眉稜上下掣痛或鼻中聞香極香聞臭極臭或只呵欠而作冒眩之狀凡此皆頭風證也治法大要有熱證者消風散用防風荆芥煎湯下無熱證者追風散用薄茶清下又有素

患頭風之人或因傷風寒暑濕依證調理已獲輕安未  
幾頭風發作則不必拘泥前藥當以頭風和平之劑療  
之其或病軀老弱先患頭風復感寒邪自汗不止此等  
用藥無附子又不可也若夫太陽項強一證無汗惡風  
則為表實合用葛根湯汗出惡風則為表虛合用桂枝  
葛根湯是又感受風邪在頭風界限之內者也入水捕  
魚入林捕兔要必知其所在斯可矣

婦人月候適行輒  
敢捫篋多成頭風

痒痛滿頭如  
水泡之狀

頭風證治

消風散治頭目昏痛鼻塞冒運

人參

羌活

川芎

白茯苓

白僵蠶

炒

霍香葉

荊芥穗

防風

甘草

炒

蟬殼

各二兩

厚朴

製

陳皮

各半兩

右末每服二錢防風荊芥煎湯調下

追風散治偏正頭風疼痛面上遊風狀若虫行

川烏

炮去  
皮尖

軟石膏

煨

白僵蠶

炒去  
背絲

川芎

防風

荊芥

甘草

炙各  
一兩

南星

炮

白附子

炮

羌活

天麻

全蝎

地龍

去  
土

白芷

各半  
兩

草烏

炮去  
皮尖

沒藥

乳香

雄黃

並研各  
一分

右為末每服半錢入好茶少許沸湯調食後臨睡服  
川芎茶調散治諸風上攻偏正頭疼

川芎

荊芥穗

各二兩

香附

去毛

薄荷

各四兩

白芷

羌活

細辛

甘草

炙各一兩

防風

三分

右末每服二錢食後茶清調下

究原抽刀散治頭風掣痛

川烏

切片鹽汁浸晒

雄黃

蟬退

去頭足各半兩

川芎

細辛

各一兩

右末每服半錢食後臨卧茶清調下

芎芷散治頭風風壅

川芎

白芷

荊芥穗

軟石膏

煨等分

右末每服一錢食後沸湯調下

香芷散治頭面諸風

新白芷

剉以蘿蔔汁浸日乾

右末沸湯調食後服或以此子搐入鼻左用右右用

左屢效

又方

新白芷

洗晒

右為末煉蜜圓彈子大每一圓食後荊芥湯嚼下妙

二陳湯

方見暑門

加荊芥治頭風兼治痰壅酒壅

如聖餅子治偏正頭疼痛連腦項吐逆惡心耳聾目暗

川烏

炮去皮炙

南星

川白蘆

各一兩

川芎

甘草

各二兩

天麻

防風

半夏

重洗去滑生各半兩

右末蒸餅糊圓雞頭大捻作餅日乾每服五餅同荊芥二穗細嚼薑湯下

細辛湯治諸頭疼及疾厥飲厥腎厥氣厥等證但發熱者不可服

附子

生

烏頭

生

南星

乾薑

川芎

細辛

各一兩

甘草

三分

右剉散每服三錢薑五片茶芽少許熟煎空心服



活人書葛根湯治太陽病頸項強無汗惡風為表實

葛根

一兩

麻黃

去節三分

官桂

芍藥

甘草

炙各半兩

右剉散每服四錢薑五片大棗一枚煎服

桂枝葛根湯治太陽病頸項強汗出惡風為表虛

桂枝

芍藥

甘草

各七錢

葛根

一兩三錢

右剉散每服四錢薑五片大棗一枚煎服

頭風方

川芎

天麻

各半兩

細辛

華陰者去苗土

爛石膏

荊芥穗

白芷梢

甘草

微炙各二錢

全蝎

炙五箇

右末白湯或茶清調食後臨卧服消風散加蟬殼白圓子加朱砂薑汁湯下皆要藥

附諸方

川芎散

拔粹方

治偏頭痛頭風神効

甘菊花

石膏

川芎

各三錢

右為末每服一錢茶清調下一方有白僵蠶六錢生用

菊花茶調散治諸風頭目昏重偏正頭痛頭風鼻塞

菊花

川芎

荆芥穗

羌活

甘草

白芷

各二兩

細辛

一兩洗淨

防風

去蘆一兩半

蟬蛻

僵蠶

薄荷

各五錢

右為末每服二錢食後用茶清調下

又方

片苓

酒炒  
五錢

蒼朮

二錢  
半

羌活

蒼耳

川芎

生甘草

酒黃連

各一  
錢半

半夏麴

炒三  
錢半

右為末服法同前

附東垣頭痛論

金匱真言論云東風生於春病在肝俞在頸項故春氣

者病在頭又諸陽會於頭面如足太陽膀胱之脉起於目内眥上額交顛上入絡腦還出別下項病衝頭痛又足少陽膽之脉起於目銳眥上抵頭角病則頭角額痛夫風從上受之風寒傷上邪從外入客於經絡令人振寒頭痛身重惡寒治在風池風府調其陰陽不足則補有餘則瀉汗之則愈此傷寒頭痛也頭痛耳鳴九竅不利者腸胃之所生乃氣虛頭痛也心煩頭痛者病在鬲中過在手巨陽少陰乃濕熱頭痛也如氣上不下頭痛

癰疾者下虛上實也過在足少陰巨陽甚則入腎寒濕  
頭痛也如痛半寒痛者先取手少陽陽明後取足少陽  
陽明此偏頭痛也有真頭痛者甚則腦盡痛手足寒至  
節死不治有厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓髓者以  
腦為主腦逆故令頭痛齒亦痛凡頭痛皆以風藥治之  
者總其大體而言之也高顛之上惟風可到故味之薄  
者陰中之陽乃自地升天者也然亦有三陰三陽之異  
故太陽頭痛惡風脈浮緊川芎羌活獨活麻黃之類為

主少陽經頭痛脉弦細往來寒熱柴胡為主陽明頭痛  
自汗發熱惡寒脉浮緩長實者升麻葛根石膏白芷為  
主太陰頭痛必有痰體重或腹痛為痰癖其脉沉緩蒼  
朮半夏南星為主少陰經頭痛三陰三陽經不流行而足  
寒氣逆為寒厥其脉沈細麻黃附子細辛為主厥陰頭  
痛項痛或痰吐涎沫厥冷其脉浮緩吳茱萸湯主之諸  
血虛頭痛當歸川芎為主諸氣虛頭痛人參黃耆為主  
為主者主治也兼見何證以佐使藥治之此立方之大

法也氣血俱虛頭痛者於調中益氣湯中少加川芎蔓  
荊子細辛其効如神半夏白朮天麻湯治痰厥頭痛藥  
也青空膏乃風濕熱頭痛藥也羌活附子湯厥逆頭痛  
藥也如溫氣在頭者以苦吐之不可熱方而治

加減三五七散

和劑方

治八風五痺肢體不仁大治風寒

入腦陽虛頭痛畏聞人聲目旋運轉耳內蟬鳴應有  
溫痺脚氣緩弱並皆治之

山茱萸

去核

乾薑

泡

茯苓

去皮各  
三兩



細辛

一兩半

防風

去蘆四兩

附子

三箇半炮去皮臍

右為細末每服溫酒食前調服

仲景麻黃湯治太陽傷寒頭痛無汗

桂枝湯治太陽傷風頭痛有汗

並見傷寒門

定風餅子

秘方

治偏正頭痛

方見傷風門

川芎散

聖惠方

治頭風偏正頭痛

羌活

細辛

川芎

香附子

槐花

甘草

炙

石膏

荊芥穗

薄荷

菊花

茵陳

防風

右為末每服二錢茶清調食後服忌動風物

清空膏治偏正頭痛年深不愈者又治風溫熱頭上壅  
及腦痛除血虛頭痛不治餘皆治之

川芎

五錢

柴胡

七錢

黃連

酒炒

防風

羌活

各一兩

炙甘草

一兩五錢

細挺子黃芩

三兩去皮一半酒製一半炒

右為末每服二錢熱盞內入茶少許湯調如膏抹在口內少用白湯送下臨卧如苦頭痛每服加細辛二分痰厥頭痛脉緩減羌活防風川芎甘草加半夏一兩五錢如偏正頭痛服之不愈減羌活防風川芎一半加柴胡一倍如發熱惡熱口渴此陽明頭痛只與白虎湯加吳白芷

白虎湯方  
見暑門

一方治傷風減風一切頭痛

甘菊

一兩

細辛

半兩

甘草

半兩

七錢

白芷

香附子

羌活

薄荷

各二兩

荊芥

二十枚

茵陳

半兩

蒼朮

浸

川芎

各兩

右為末每服二錢茶清調下婦人產後當歸石膏末

調下

寶鑑石膏散治頭疼

川芎

石膏

白芷

各等分

右為末每服四錢熱茶清調下

豆粉丸

聖惠方

治風熱頭疼

川芎

細辛

甘草

白芷

豆粉

各二錢半

薄荷

石膏

各半兩

朴硝

二錢

右為細末煉蜜和丸如彈子大石膏末為衣每服一丸細嚼茶清下

徹清膏

蔓荊子

細辛

各一分

薄荷葉

川芎

各二分

生甘草

炙甘草

各五分

藁本

一錢

右為末茶清調二錢下

半夏白朮天麻湯治脾胃証已經服疎風丸下二三  
元証不瘳增以吐逆痰唾稠粘眼黑頭旋目不敢開  
頭苦痛如裂四肢厥冷不得安卧此氣虛頭痛也

黃栢

二分  
酒洗

乾薑

三分

澤瀉

白茯苓

天麻

黃耆

人參

蒼朮

各五分

炒神麴

白朮

各一錢

麥芽

半夏

湯洗

陳皮

各一錢半

右每服五錢水煎熟服

順氣和中湯治氣虛頭痛此藥升陽補氣頭痛自愈

黃耆

一錢半

人參

一錢

甘草

炙七分

白朮

陳皮

當歸

芍藥

各二分

升麻

柴胡

各三分

細辛

蔓荊子

川芎

各二分

右作一服水煎食後服亦治氣血俱虛頭痛

安神湯治頭旋眼黑頭痛

羌活

一兩

防風

二錢半

柴胡

升麻

各半兩

黃蘗

酒製一兩

知母

酒製一兩

生地黄

半兩

黃耆

二兩

炙甘草

生甘草

各二錢

右件每服秤半兩水二盞煎至一盞半加蔓荊子半



錢川芎三分再煎至一盞去滓臨卧熱服

芎歸湯治血虛頭痛

川芎

當歸

各等分

右每服五錢水煎服

調中益氣湯治氣血俱虛頭痛

方見脾胃門

內加川芎三分蔓荊子三分細辛二分

眉眶痛

丹溪云眉眶痛者屬風熱與痰作風痰治類痛風

一方

黃芩

酒浸炒

白芷

右為末茶清調二錢

選奇湯治眉骨痛不可忍大有効

羌活

防風

甘草

各二錢

酒黃芩

一錢冬月不用

右每服三錢水一鍾煎七分食後溫服

一方治頭痛連眼痛此風痰上攻須用白芷開

雨前茶

川芎

白芷


防風

藁本

細辛

當歸

右用水煎服



仁齋直指卷十九